



Presentaciones en carteles 29

Toxoplasmosis en pacientes inmunodeprimidos.**Toxoplasmosis in immunosuppressed patients.****Toxoplasmose em doentes imunodeprimidos.**

Ekaterines Zayas Tamayo¹, Karelía Columbié González¹, Ivett Mesa Castellanos¹, Adeline Pérez Infante¹, César Poutou Sánchez¹.

RESUMEN

Introducción: La toxoplasmosis representa un importante riesgo para la salud y su forma de expresarse cobra importancia en los pacientes inmunodeprimidos.

Objetivos: Determinar la incidencia de toxoplasmosis en pacientes con afecciones clínicas

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo, transversal, para determinar la incidencia toxoplasmosis en pacientes con afecciones clínicas. Desde enero 2020-diciembre 2021, en la provincia Santiago de Cuba. La población estuvo constituida por 264 sueros procedentes de todos los municipios de la provincia, procesados mediante la técnica Toxoplasma Látex.

Resultados. De 264 muestras clínicas procesadas, 51 resultaron positivas (19.3 %), prevaleciendo la Retrovirosis crónicas (66.6 %), síndrome febril prolongado (17.6 %). Predomino el sexo masculino (60.6 %), grupo de edad 30-39 años.

Conclusiones. La identificación temprana y el manejo adecuado de la toxoplasmosis son cruciales para reducir las complicaciones asociadas, constituyendo un desafío para la salud pública con un predominio significativo entre los adultos jóvenes, con sistemas inmunitarios inmunocomprometidos.

Palabras claves: inmunocompetentes, retrovirosis, zoonosis, prevención, diagnóstico.

¹ Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Laboratorio Provincial de Microbiología. Santiago de Cuba.

Correspondencia:

Ekaterines Zayas Tamayo
ekaterine@infomed.sld.cu

Este artículo debe citarse como:

Zayas Tamayo, E.; González, K.C.; Mesa Castellanos, I.; Pérez Infante, A. & Poutou Sánchez, C. «Toxoplasmosis en pacientes inmunodeprimidos». UO Medical Affairs. 2025; 4(1): 100-101

SUMMARY

Introduction: Toxoplasmosis represents a significant health risk, and its manifestations are becoming more important in immunosuppressed patients.

Objective: To determine the incidence of toxoplasmosis in patients with clinical conditions.

Method: A descriptive, cross-sectional, observational study was conducted to determine the incidence of toxoplasmosis in patients with clinical conditions. From January 2020 to December 2021, the study was conducted in the province of Santiago de Cuba. The sample consisted of 264 sera from all municipalities in the province, processed using the Toxoplasma Latex technique.

Results. Of 264 clinical samples processed, 51 were positive (19.3 %), with chronic retroviral infections (66.6 %) and prolonged febrile syndrome (17.6 %) predominating. Males predominated (60.6 %), and the age group was 30–39 years.

Conclusions. Early identification and proper management of toxoplasmosis are crucial to reducing associated complications. This is a public health challenge with a significant prevalence among young adults with compromised immune systems.

Keywords: Immunocompetent, retroviruses, zoonosis, prevention, diagnosis.

significativo para a saúde, e as suas manifestações estão a tornar-se mais importantes nos doentes imunodeprimidos.

Objetivo: Determinar a incidência de toxoplasmose em doentes com condições clínicas.

Método: Foi realizado um estudo descritivo, transversal e observacional para determinar a incidência de toxoplasmose em doentes com condições clínicas. De janeiro de 2020 a dezembro de 2021, o estudo foi realizado na província de Santiago de Cuba. A amostra foi constituída por 264 soros de todos os concelhos da província, processados pela técnica Toxoplasma Látex.

Resultados. Das 264 amostras clínicas processadas, 51 foram positivas (19.3 %), com predomínio de infeções retrovirais crónicas (66.6 %) e síndrome febril prolongado (17.6 %). Predominou o sexo masculino (60.6 %) e a faixa etária foi dos 30 aos 39 anos.

Conclusões. A identificação precoce e a gestão adequada da toxoplasmose são cruciais para reduzir as complicações associadas. Este é um desafio de saúde pública com uma prevalência significativa entre os jovens adultos com sistemas imunitários comprometidos.

Palavras-chave: Imunocompetente, retrovírus, zoonose, prevenção, diagnóstico.

RESUMO.

Introdução: A toxoplasmose representa um risco

