

**Presentaciones orales 3**

Caracterización socio-demográfica y clínica de pacientes adultos con toxoplasmosis ocular.

Socio-demographic and clinical characterization of adult patients with ocular toxoplasmosis.

Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes adultos com toxoplasmose ocular.

Isabel Ambou Frutos^I, Alba Rosa Govea Pacho^{II}, Ledys Linares Cárdenas^{III}, Dora Enma Ginorio Gavito^{IV}, Leonel Ramos Bello^I, Claudia Hernández Cruz^I

RESUMEN

Introducción: La toxoplasmosis es la principal causa de uveítis posterior infecciosa.

Objetivos: Describir las características socio-demográficas y clínicas de los pacientes con toxoplasmosis ocular.

Método: Estudio observacional, descriptivo, transversal de pacientes con toxoplasmosis ocular, que asistieron a la consulta de Uveítis del Instituto Cubano de Oftalmología «Ramón Pando Ferrer», en el período de octubre del 2023 a octubre del 2024. La muestra quedó conformada por 38 ojos correspondientes a 32 pacientes.

Resultados: Predominó el grupo de edades de 50 años y más (46.9 %) y el sexo masculino (62.5 %). La procedencia urbana ocupó 75 % y poseían animales domésticos el 71.8 %. Prevalció la forma típica (73.6 %), y la uveítis posterior se manifestó en 65.7 % de los casos. La retinocoroiditis focal predominó en 16 ojos (42.1 %) y la membrana neovascular fue la complicación más frecuente (10.5 %). El 59.3 % de los pacientes se trató con la terapia clásica y 47.3 % alcanzó una agudeza visual mejor corregida final entre 50 a 80 VAR.

Conclusiones: El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son esenciales para minimizar las complicaciones y evitar discapacidad por la pérdida de la visión.

Palabras claves: toxoplasmosis ocular, uveítis posterior, retinocoroiditis.

^I ICO «Ramón Pando Ferrer», La Habana, Cuba.

^{II} Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. La Habana, Cuba.

^{III} Hospital Clínico Quirúrgico «Miguel Enríquez», La Habana, Cuba.

^{IV} Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, La Habana, Cuba.

Correspondencia:

Isabel Ambou Frutos
isabel.ambou@infomed.sld.cu

Este artículo debe citarse como:

Ambou Frutos, I.; Govea Pacho, A.R.; Linares Cárdenas, L.; Ginorio Gavito, D.E.; Ramos Bello, L. & Hernández Cruz, C. «Caracterización socio-demográfica y clínica de pacientes adultos con toxoplasmosis ocular». UO Medical Affairs. 2025; 4(1): 25-26

SUMMARY

Introduction: Toxoplasmosis is the main cause of infectious posterior uveitis.

Objective: To describe the socio-demographic and clinical characteristics of patients with ocular toxoplasmosis.

Method: An observational, descriptive, cross-sectional study of patients with ocular toxoplasmosis who attended the Uveitis Clinic of the Cuban Institute of Ophthalmology «Ramón Pando Ferrer» from October 2023 to October 2024. The sample consisted of 38 eyes corresponding to 32 patients.

Results: The age group 50 years and older (46.9 %) and male sex (62.5 %) predominated. Urban origin accounted for 75 % and 71.8 % owned pets. The typical form prevailed (73.6%), and posterior uveitis occurred in 65.7 % of cases. Focal retinochoroiditis was prevalent in 16 eyes (42.1 %), and neovascular membrane was the most frequent complication (10.5 %). 59.3 % of patients were treated with conventional therapy, and 47.3 % achieved a final best-corrected visual acuity between 50 and 80 VAR.

Conclusions: Early diagnosis and appropriate treatment are essential to minimize complications and prevent disability due to vision loss.

Keywords: ocular toxoplasmosis, posterior uveitis, retinochoroiditis.

RESUMO

Introdução: A toxoplasmose é principal causa de

uveíte posterior infecciosa.

Objetivos: Descrever as características sociodemográficas e clínicas de pacientes com toxoplasmose ocular.

Método: Estudo observacional, descritivo e transversal de pacientes com toxoplasmose ocular, que compareceram à consulta de Uveíte do Instituto Cubano de Oftalmologia «Ramón Pando Ferrer», no período de outubro de 2023 a outubro de 2024. A amostra foi composta por 38 olhos correspondentes a 32 pacientes.

Resultados: Predominou a faixa etária de 50 anos ou mais (46.9 %) e o sexo masculino (62.5 %). A origem urbana foi responsável por 75 % e 71.8 % possuíam animais domésticos. A forma típica prevaleceu (73.6 %) e a uveíte posterior ocorreu em 65.7 % dos casos. Retinocoroidite focal foi predominante em 16 olhos (42.1 %) e membrana neovascular foi a complicação mais frequente (10.5 %). 59.3 % dos pacientes foram tratados com terapia convencional e 47.3 % alcançaram uma acuidade visual final melhor corrigida entre 50 e 80 VAR.

Conclusões: O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para minimizar as complicações e prevenir a incapacidade devido à perda da visão.

Palavras-chave: toxoplasmose ocular, uveíte posterior, retinocoroidite.

